

IN CLAR. LAMURE, PARERGON
DE ANEVRYSMATE,
ANIMADVERSIONES HONORATI PETIOT.



ULLA dari anevrysmata vera, quæ sint notabilia; hujusque assertionis probari veritatem ex Clar. Ruyschii obser. 38. & obser. thesauri IX. no. v. contendit egregius Antagonista; ego autem contrarium demonstro.

I. Ut verò omnis tollatur ambiguitas quoad hujusce vocis *notabilis* significationem, hanc determinare voluit adversarius, in eo quidem laude dignus si scopum sibi propositum attigisset, at quam longè absit, cito patefiet. Sic enim ille primâ scripti sui paginâ, cum vox illa *NOTABILIS*, nimis vaga fortè quibusdam videri queat, illam sic paulò exactius determino; cum ovi columbini, aut Gallinacei magnitudinem æquans anevryσμα notabile vocaverint auctores, in arteriâ intercostali aut brachiali, anevrysmum notabilem dicam qui similem proportionem habeat ad naturalem arteriæ affectæ diametrum.

II. Ea vocis explicatio nimis adhuc vaga est, imo obscurior, non enim determinare videtur antagonista, in quânam arteriâ anevrysmus æquans ovi gallinacei magnitudinem, dicitur *notabilis*; ait tamen; *anevrysmum notabilem dicam qui similem proportionem habeat ad naturalem arteriæ affectæ diametrum*. Si igitur *Anevrysmi* similes, juxta mentem Antagonistæ comparari debent inter se, ut notabiles habito respectu diametri naturalis arteriæ affectæ judicentur; sed quâ ratione comparari poterunt? quomodò notabile nuncupabit adversarius illud anevryσμα quod similem proportionem habeat ad naturalem arteriæ affectæ diametrum, nisi priùs fuerit determinata arteria in quâ fit anevryσμα ovi Gallinacei magnitudinem æquans. Verùm ut initia malè posuit, sic cætera sequuntur; quâcumque enim viâ procedat nunc, ex ejus computandi lege semper quid absurdum subsequetur. Etenim . . . jam supponamus anevrysmatis locum & sedem reipsâ determinasse antagonistam; in eo casu tale locat anevryσμα aut in majoribus arteriis, in aortæ trunco v. g. aut illud locat in ipsâ

2

intercostali arteriâ ; hoc ultimum fecisse adversarium, haud ego crediderim, (licet ex ipsius scripto ita pateat) nam exurgerent anevrysmata in aortâ ; quorum sectiones, non plures tantum pollices, sed pedes haberent ; horum enim sectiones excederent sectionem ejusdem aortæ in statu naturali 2, 5 3. $\frac{11}{12}$. pol.

14.

O MONSTROSUM ANEURISMA. Si è contra anevrysmata suum æquans magnitudinem ovi gallinacei in ipsâ aortâ statuerit, ex eodem calculo *aneurysmum* appellabit notabilem in arteriâ intercostali, cujus sectio excederet tantum sectionem ejusdem arteriæ in statu naturali $\frac{1}{1}$. pollicis ; quod supponit

146.

elongationem radii ejusdem arteriæ intercostalis $\frac{1}{1}$ lineæ. Ex iis patet cuicumque

4

nè minimè determinatam fuisse *hanc vocem NOTABILIS*. Hæc tamen stabilità (uti opinatur) determinatione, problema solvere nititur. *dixi vix ac ne vix quidem apud auctores reperiri exemplum anevrysmi veri sensu superius allato qui fuisset notabilis*. Itaque vix admittit egregius antagonista reperiri anevrysmata sine ruptione parietum, quæ sint *notabilia*, imò ne vix quidem admittit : quid mirum ! ipsius determinationis habitâ ratione. Verùm ea, nequaquam recusat quæ in ejus determinatione includuntur ; unde necessario concludendum venit, vel eum anevrysmata agnoscere monstrofa adeò, ut nemo certè præter ipsum, ea unquam admittit ; vel econtra eum admittere *anevrysmos* (quos dicet esse notabiles) qui ab ullo vix ac ne vix quidem detegi valent, aut saltem vix sunt sensibiles, cum aliqualis sit semper longitudinis ea arteriæ minima dilatio, cujus quidem ut demonstravimus, radii prolongatio major, est tantum $\frac{1}{1}$ lineæ.

4

III. Quoad autem istud Antagonistæ responsum, omnibus notatum velim, eum obstinatè nulla omnino dari vera anevrysmata primò contendisse, admonitum dein à me, exigua admitti à *freindio*, hæc in sui octavâ prælectione pariter admisisse, porrò eam subjungendo notam, *dari equidem exigua, sed notabilia fieri non posse*, quæ ultima reperiri etiam apud auctores, cum apertè demonstraverim ex *Ruyfchio* & *littrio*, nunc ut se se expediat, vagam istius vocis *notabilis* significationem adhibet, ad errores Typographi merè fictitios confugit, clausula admittit anevrysmata, ut respondeat observationibus *Clar. Ruyfchii & littrii*. quid varia hujuscemodi responsa demonstrant ? sibi ne constat Antagonista ? ea loquendi ratio decet ne veritatis de-

Diameter ovi Gallinacei	==	18. lineas. seu	==	$\frac{3}{2}$	pol.
-------------------------	----	-----------------	----	---------------	------

Diameter aortæ naturalis	==	12. lin.	seu	==	1. pol.
--------------------------	----	----------	-----	----	---------

Diameter art. interc. natur.	==	1. lin.	seu	==	$\frac{1}{12}$ pol.
------------------------------	----	---------	-----	----	---------------------

fenforem? nonne potius attendenti cuique palam erit egregium competitorē longè à veritatis tramite primò quidem aberrasse, nunc verò tacitè ad eam ut gradatim accedat, vires & conatus edere?

IV. Non ea ergo quæstio inter nos agitur, utrum vera dentur anevrysmata, utrum exigua, utrum notabilia quædam; hæc omnia jam faretur Antagonista, id tantum inter nos inerit discriminis, num veri & notabilis (juxta mentem medic.) anevrysmatis exempla vix ac ne vix quidem reperiantur apud auctores; observata quæ pag. 12. ex variis anevrysmatum dissectionibus refero rem statim dijudicabunt. Verum observationibus non eget adversarius, qui egregia de eadem materie scripsit, *Dissert. de fluxu menstruo*, nemo sanè evidentius demonstravit arteriarum fieri dilatationes, & earum absque rupturâ parietum expansiones; imo iudice eo, monstrosæ, enormes, & prodigiosæ spatio aliquot mensium fiunt *absque ullo incommodo, uti probant omnium auctorum observationes*. Hæc mihi summi ponderis erit autoritas, nec certè denegabit eam Athleta. En itaque propria ejus verba. *Dissert. pag. 35. vasa uterina graviditatis tempore ENORMITER dilatantur, ita ut vas admodum exilè videatur tunc arteria emulgentis diametrum obtinuisse, sinusque vix sensibiles alioqui, in iisdem circumstantiis manus pollicem admittere queant; uti probant omnium auctorum observationes*. Additque pag. seq. *notum est omnibus vasa uterina in gravidis PRODIGIOSE DILATARI ABSQUE ULLO INCOMMODO*. Hæc eadem repetit adversarius in diversis ejusdem Dissertationis locis, ità ut ipsi hanc veritatem verè cognitam fuisse, nullus sine injuriâ possit dubitare, nec certè Antagonistam fugerat, *Clar. Nichols* in actis Anglicanis, verorum anevrysmatum demonstrando existentiam, iisdem omninò uti argumentis (†) & quidem si vasa admodum exilia, vixque sensibilia, mensium spatio aliquot *absque ullâ ruptione arteria, absque ullo incommodo* arteriæ emulgentis diametrum acquirant, *si sinus uterini alioquin vix sensibiles, ita dilatentur ut manus pollicem admittant*, quid erit de arteriâ sensibili? quid de magnis arteriis? quid demum de ipsâ aortâ? monstrosa fieri anevrysmata plurium spatio annorum, certè haud recusabit eximius competitor, si sibi metipso fidem adhibeat: ergo transcamus ad secundam assertionem.

V. *Ruysschium* ipsi favere in *Observ. 38.* perhibuit Antagonista, & hujus obser. verba quædam citat pag. 3. scrip. Quibus aortæ ruptas fuisse tunicas, judi-

† On a disputé pendant quelque-temps avec assés de chaleur, si l'Anevryisme étoit formé, ou non, par la dilatation simple de l'Artere, ou par la rupture de ses Tuniques internes, & la distention de ses Tuniques externes... La possibilité de la dilatation de l'Artere est prouvée par la raison & par l'inspection même. Dans la grosseisse on trouve partout les Arteres uterines augmentées de grosseur & de diametre, à proportion de la dilatation de L'uterus... Il est arrivé en effet dans plusieurs cas, que les palpitations du cœur ont été accompagnées de grandes dilatations de l'Aorte; j'en ai vu des exemples, tant sur des Hommes, que sur des Animaux. *Le Docteur Nichols.*

4

œ *Ruyfchio*, & inter eas stagnasse sanguinem, peroptat suadere. Sanguis, inquit, inter lamellas stagnans & aliunde acrimoniam contrahens, paulatim transudabat, & ossa lentè corrodebat *Ruyfch.*... At quare hancce observationem mutilavit? Cur ibi vocem precisè omisit, quâ lectorem *Ruyfchius* monet lamellas de quibus loquitur, nequaquam esse lamellas aortæ, sed esse pseudo-lamellas è sanguine confectas? En enim verba *Ruyfchii*. *Sanguis inter lamellas istas stagnans*. Hæc vox, *ISTAS*, omnem tollit ambiguitatem, uti paulò supra notaverat *Ruyfchius*, ne locus errori esset. † An catè siluerit hanc vocem egregius antagonista? Haud ipse profectò dubitavit ex eâ observatione *Ruyfchium* admonere, in arteriâ multùm dilatatâ, in anevrysmate putà monstroso, præter expansionem arteriæ, lamellas quandoque reperiri, seu tunicas ab ipso cuore coagulato productas, in quarum interstitiis stagnat sanguis; porrò, ne sit locus errori, ne quis eas incautè credat tunicas aortæ proprias, lectorem admonet ex professo *Ruyfchius* dicens, *harum tunicarum extrema propriè arteria aorta erat*. Hæ ergo tunicæ non propriæ erant aortæ *vel jndice *Ruyfchio*, ergo neque rupti erant aortæ parietes, ergo ea ipsa constabat suis tunicis, at maximè solummodò dilatata. (a)

† *Ruyfch. obs. pag. 38*. Post obitum hoc Anevrysmâ (quod ortum duxit ex Arteriâ Aortâ tribus circiter digitis transversis suprâ cor) a me inventum fuit quasi lamellatim, (ut ità loquar) dispositum, aut ex innumerabilibus Tunicis, crassis, carnosiss, & satis tenacibus sibi invicem impositis, conflatum, inter QUAS TUNICAS Sanguis copiosus & coagulatus delitescibat. Harum Tunicarum EXTIMA, QUÆ PROPRIÈ ARTERIA AORTA ERAT, straminis habebat latitudinem

* Ejusmodi Tunicas è sanguine confectas, in thesauris passim habet *Ruyfchius*, ipse è proprio sanguine membranas fecit artificiales veris membranis simillimas.

(a) Hinc *Heisterus* ut verum, & ut ex integrâ Arteriæ pronatum diductione, citat illud Anevrysmâ. Cap. xiiii. Chir. pag. 391. ita *Clar Ferrenz*, in thesi nonâ disp. & ibidem ait, ab aortæ Anevrysmate summopere expanso, costas diffRACTAS in „ nosocomio massiliensi bis observare contigit, & à *Ruyfchio* annotatum legimus.

Quomodo sæpè caries ossium subsequatur in eo casu, optimè dicunt viri egregii, *Littrius*, *Lancisius*, *van Swieten*. Scilicet quia ob pressionem inductam ab Anevrysmate, premittitur periosteum, vasa ejus sparsim strangulantur, plurima inflammantur, sitque suppuratio, undè ipsa caries, sacco interim Anevrysmatis integro subsistente. Ità & ipse *Freindius*. „ In ossibus caries Anevrysmâ sæpè comitatur, casus „ duo apud *Ruyfchium* leguntur... neque verò intellectu difficile est quomodo tumor „ talis jugi pressione periosteum afficere, in eoque obstructionem creare valeat, undè „ paulatim os ipsum exedatur. „ Hist. Medic. pag. 54. vel juxtâ *Ruyfchii* mentem quandoque fieri potest per diapedesim, tenuissimi cruoris halitus putrefacti transudatio, vim corrosivam exerentis; docet equidem Chimia tunc spiritum veluti Alkalinum è putrefacto sanguine produci, per poros minutissimos maximè penetrantem; docet bilis transudatio, ità potuisse cruorem transudare, non quidem sub rubri sanguinis formâ, sed ichoris, quin exindè parietes aortæ fuerint corrosi; quam difficile à pure vasa majora corrodantur, ossis licet, aliisque partibus corrosis, docent ulcera, & eucharoticorum applicatio, ut inter alios, viri clarissimi *Mangetus* Bibl. Chir. tom. i. pag. 80. *Monro* essais de Medec. tom. ii. annotant. Hæc monui ne quis statim in casu *Ruyfchii* [datâ etiam hæc transudatione] ruptio-

VI. Si hæc Antagonistam minùs moveant, audiat *Celeb. van Swieten* eandem Ruyschii observationem, sed cum annotatione subindicatâ referentem. (a) Quid reponet Antagonista. *Clar. van Swieten* tam apertè, tam nitidè dicenti sanguinem in eo casu, non inter aortæ tunicas, at inter pseudotunicas, ut dictum fuit, stagnare, nihil sibi superesse quò effugiat, lubens concedet ne adversarius? pag. 6. exam. resp.

VII. Ut ea quæ demonstrationem in iisce prorsus sapiunt everterentur, mirâ cum solertiâ reponit adversarius, adest error Typographi in observatione Ruyschii, & ita legendum, inquit, *harum tunicarum extrema quæ PROPRIA ERAT ARTERIÆ AORTÆ straminis habebat latitudinem.* retuli observationem parag. V. judicet ipse lector, an ibi sit error Typographi, an tot immutare, & substituere potuerit Typographus, quin id animadverteret Ruyschius, qui hanc Typis observationem commisit, ut quid novum, & ut Chirurgis maximi momenti, & qui præterea in præcedenti (observatione nimirum 37.) rem apertè declarat. * ex hac observatione nonnè constat Ruys-

nem dari aortæ credidisset. De eâdem re audiatur *celeb. Douglassius.* Hæc autem corrosio, & ruptio (Si daretur) aneurisma sequitur, & neutiquam pro causâ ejus venditari potest. Tumor enim jam ante corrosionem præsens est, & solâ dilatatione efformatur. Dissert. de perit. pag. 56.

[a] Ea legantur attentè, quia hujusce paragraphi verba quædam mox citantur ab Antagonistâ ad erroris Typographi, quem ibi fingit, suspensionem firmandam.

„ In maximis anevrismatibus sæpe apparuit membranas extensi talis sacci esse, crassissimas, cum potius vitleretur distracta membrana tenuior fieri debere, hoc autem videtur fieri, quia sanguis in dilatatum hunc saccum aggestus, in polypositas concrevit massas, quæ applicatæ tunicæ ARTERIÆ DILATATÆ illius crassitiem immanitèr possunt augere; sic in ingenti illo anevrismate [observo. 38.] vidit Ruyschius innumerabiles tunicas, crassas, carnosas, satis tenaces, & sibi invicem impositas auxisse crassitudinem membranæ, sic ut INTER HAS TUNICAS sanguis copiosus & coagulatus delitesceret. EXTERIOR TAMEN TUNICA QUÆ AORTÆ, DILATATA MEMBRANA ERAT, STRAMINIS TANTUM CRASSITIEM HABEBAT, omnis reliqua moles à concretionibus illis polyposis pendebat., Parag. 176. exterior respectivè ad pseudotunicas erat, sed interior respectu aortæ.

„ * Antè duodeviginti annos cadaver cujusdam viri dissectui, qui à longo tempore anevrysmâ gestarat in pectore, tantæ magnitudinis, ut infantis recenternati caput adæquaret cum tantâ pulsatione ut manum pectori admotam percuteret. Aperto cadavere, anevrysmâ invenimus in arteriâ magnâ ascendenti, transversum digitum unum atque alterum à corde, ut annexâ fig. 38. representatur, in accretione hujus anevrysmatis non solum costæ veræ, a se invicem abscedere coactæ fuere, verum etiam eas invenimus ita corruptas, ut magnâ ex parte decerent, quodque ex iis restaret, digitis conficando in pulvem comminere haud difficile esset. Hanc historiam cum ante multos annos *Domino Vander Setagen* medicinæ doctôri dum viveret celeberrimo, reserrem, dixit mihi à se quæque visam costarum cariæ ab anevrysmate pectorali ortam. MAGIS CERIÈ MIRANDUM QUAM EXPLICANDUM FORET, QUOMODO CLAUSUM ANEVRYSMÂ (QUOD TANTUM ARTERIÂ DILATATA AUDIT) COSTAS ITA CORRUMPERE VALUERIT, NISI SEQUENS HISTORIA NUMPER MIHI OBVENISSET. Ruisch. Obs. 17.

chium mirari quomodo caries subsecuta fuerit *ab anevrysmate clauso*, seu ipse loquitur, *ab arteriâ nimis dilatâ*. Caries aderat costarum, arteria tamen non erat rupta, sed integra subsistebat constans suis tunicis; illud ideo erat Ruyschio phænomenon magis certè mirandum, quam explicandum, nisi in sequenti observatione rationem hujusce rei stupendam reperiisset. Si ruptam fuisse aortam deprehendisset, vel corrosam, si extravasatum cruorem, aut intra plevram ipsam conclusum, nonne id protulisset statim, & an tantoperè fuisset demiratus? sibi constar sanè Ruyschius, quidquid asserat adversarius, nec certè sibi constaret, si aortæ parietes rupti fuissent, ac si legendum esset ut suadet Antagonista; quid enim mirum caries costarum in eo casu exhibuisset Ruyschio? utrum ergo cum aliquali, vel minimâ veritatis specie dixerit Antagonista ibi adesse errorem Typographi; & Ruyschii textum à *Clar. van Svoieten* correctum fuisse, ex prægressis statuatur lector æquissimus.

VIII. At defertur per præcipitia validissimus athleta, novâ etenim & mirâ labitur hallucinatione, dum *celeb. van Svoieten* auctoritatem sibi venditat: lectorem itaque rogo ut sequentia legat attentè. Nemo evidentius quam citatus auctor demonstravit id Ruyschii anevrysmâ verum fuisse, nam *eo judice, membrana arteriæ interna minimè corrosa, minimè rupta, sed integra & illæsa remanserat* ... *Clar. van Svoieten* commentatus fuit Boerhaavii aphorismum 176. ubi casus recensentur in quibus *arteriarum tunica interior illæsa & integra remanet*, licet afficiantur aliæ (a) cum ergo audiamus singula hujusce aphorismi verba commentantem. (b) Ea est ibi precisè observatio

[a] Boerhaavius Aphor. 176, „tunicæ arteriarum exteriores, *illæsa interiori*, punctæ; „sectæ, tussæ, distractæ, erosæ, impetu sanguinis dilatantur, saccum formant, „qui ad ovi sæpe magnitudinem crescit, callosos parietes acquirit, pulsât, colore „rubello splendet, compressus evanescit, laxatus redit, suam arteriam ampliat, „vicina vasa comprimendo angustat. ANEVRYSMA VERUM VOCATUR.

[b] Dictum fuit alibi, quænam sequantur mala, quando arteria integrè discif- „sa est, vel quando vulnus in cavum usque arteriæ penetrat, licet illam integrè „non disciderit. HOC PARAGRAPHO expenduntur illa mala, quæ metuenda sunt, „QUANDO ARTERIÆ SIC VULNERANTUR, UT VULNUS NON PENETRET „IN ILLARUM CAVUM, SED TANTUM TUNICAS EXTERIORES DIVIDAT... „Si jam in quodam arteriæ loco, separatâ cohæsione imprimis fibrarum articula- „rium [nam læsio tunicæ externæ & cellulosæ videntur minùs periculosæ] minua- „tur firmitas laterum, causa distendens manens eadem, illò in loco plus dilata- „bit arteriam, mutabit æquabilem figuram conici canalis, expandet locum illum „debilitatum in SACCUM, TUNC VOCATUR ANEVRYSMA VERUM, PRO- „PRIA VOCABULI VI DESIGNANS TANTUM DILATIONEM ARTERIÆ „& pag. 262 à quacumque jam enarratis causis arteria in quodam loco debilior „facta fuerit, illò in loco plus cedit distendenti sanguini, & expandetur, cum- „que singulis cordis ictibus causa illa distendens applicetur de novo huic loco de- „bilitato, augebitur anevrysmatis capacitas, UNDE IN IMMANEM MOLEM SÆPE „ANEVRUSMATA EXPANDUNTUR, imprimis si in magnis arteriarum truncis „fiant. SIC VIDIT RUYSCHIIUS OBSER. 38. hominem qui in pectore gerebat „spontè factum anevrysmâ tantæ magnitudinis, ut pulvinar mediocre, quo in sedili „utimur, æquaret.

7

Ruyfchii, de quâ lis inter nos. Credidit ne ergo *van Svieten tunicam aortæ* interiorem hic fuisse ruptam? credidit ne *sacculum anevrysmalem* à solâ exteriori membranâ aortæ (interioribus ruptis) fieri? nequaquam hercle. casus similes in quibus interiores tunicæ subsistunt integræ, (ruptis externis) reperiuntur sparsim apud medicos; ipse *van Svieten* ibidem talem recitat observationem. (a) ejusmodi anevrysmata saltem ut vera habebit adversarius: hæc autem facta fuisse ex arteriæ tunicâ externâ, interioribus ruptis, haud sanè reponet; & eo minùs quia hanc interiorem tunicam integrè subsistentem, scrupulosissimè *Pareus*; *Littrius*, *Duvernoy* aliique plures demonstrarunt, ut videbimus infra. Quo igitur consilio *Clar. van Svieten* citavit, qui tantoperè ipsi adversatur (b)

[a] In Cadavere vidi arteriam subclaviâ dextram in *sacculum ingentem dilata-* tam, sic ut anevrysmatis hujus membrana, chartæ tenuitate superaret, & per illam pellucidam contentus sanguis conspici posset, levi vulnere inflicto, ingens copia sanguinis concreti erupit.

Clar. Lancisius speciatim de iis casibus agit propositione XIX. Tract. de anevrysmate. Quæ ita inscribitur. *de anevrysmate ex arteriarum vulnere, in quo externa duntaxat tunica vulnerata fuerunt ... hujus mali* [inquit *Lancisius*] *multorum historias referre hic possem, qui in hujusmodi mortum inciderunt, quos inter duos ipse vidi. Unum in nosocomio Sti. Spiritus, alterum in urbe.*

Sic Heisterus Chir. par. 1. lib. 1. pag. 42. "ipsum anevrysmâ fieri etiam non raro solet, quoties exterior quædam arteriæ tunica læsa fuit, hic enim tantum abest, ut tunica interior, LICET ILLÆSA SIV, vehementiorem sanguinis pulsus impune sustineat, ut potius in quamdam quasi sacculi formam paulatim dilatata, quam plurimis iisdemque gravissimis malis ansam præbeat,; hinc ipse Heisterus agendo de Anevrysmate. *Mirandum Doctissimum alius Freind um*, in hist. Med. *Contendere omne Anevrysmâ ex rupturâ arteriæ oriri ... Anevrysmatum verorum ex integrâ arteriæ ipsâ diductione, exempla notatu dignissima descripta à me extant in annalibus Academiæ Julis, semestri xii. an 1727. Aliaque varia à Pareo, & à Ruyfchio in obser. Chirur. [nempe in obser. 37. 38.] In Hist. Acad. Reg. an. 1712. [nempe Littrii obser.] & 1721. in Lancisio de Anevrysmate, itemque lib. de mortibus subitaneis.*

Sic etiam Do. James. Dictionnaire universel de Médecine, tom. premier. Jene puis me dispenser de faire remarquer au Lecteur, que le Docteur Freind, n'a point entendu du tout le passage de *Paul Eginette*, qui a donné lieu à sa Dissertation. Car, *Paul* distingue évidemment deux sortes d'Anevrysmes, l'une par dilatation, & l'autre par rupture.... les observations d'Anevrysmes que je vais rapporter, serviront à prouver contre le Docteur Freind, que la distinction de cette Maladie en vraie & en fausse, n'est pas sans fondement, comme il le prétend.

[b] Sic enim pag. 149. anevrysmâ vel potius, Anevrysmâ dicendum, designat arteriæ integræ dilatationem præternaturalem in quâdam parte, sic ut arteria, quæ antea uniformem canalis conoidæ figuram habebat, nunc in quâdam parte debilitata expandatur in sinum, qui omnia vicina comprimendo, pessima potest producere mala, sic ab Anevrysmate, circâ vitalia viscera hærente... costas penitus cariosas, imò cum ossæ æterno in nihilum redactas vidit *Ruyfchius*, [obser. 37. & ob. 38.]... item quod Anevrysmâ dicitur in arteriis, illud si in venis obtineat, vocatur varix, frequentius longè malum, quam Anevrysmâ, quia & venæ facilius cedunt causæ diffidenti. Item agens de spurio Anevrysmate, pag. 268. Quia jam tumor talis quædam habet communia signa cum Anevrysmate propriè dicto ideo vocave-

IX. Eâdem paginâ dicit adversarius observationem 37. *Ruyſchii, eſſe anevryſmi clauſi, qui nuſquam ab eo fuit negatus poſſe obſervari.* Verum ſi Ruyſchium attentè pervoliſſet, anevryſma clauſum & verum, unum & idem eſſe apud eum (a) neque ullatenus ab invicem diſtingui, procul dubio obſervaiſſet. Adverſatur ergo antagoniſtæ (*) hæc obſervatio; neque minùs ei adverſatur obſervatio delumpta ex theſauro nono, uti ex ipſius lectione (b) cuicumque palam erit.... ſimilem non ſemel, ſed ter quater ve vidit caſum ſcrupuloſus ille vir in minutiffimis partium perſcrutandis; nihilominùs miratur arteriam tam exilem in tantam molem ſe ſe potuiſſe extendere. Ergo in tantam molem verè ſimpliciter erat extenſa intercoſtalis arteria abſque parietum ruptione; ad quod credendum impelleretur, qui Ruyſchii theſauros, ejuſque tot inventa luſtraverit, nemo nescit clar. virum, non ſolum amicis, ſed cuicumque obvio hæc omnia millies demonſtraſſe minutiffima deſignando, & quidem hanc perſcrutando arteriam tantoperè dilatata, ſtatim occurrit menti, an ibi non fuerit ruptio parietum? an verè ſit integra arteria. at inquit antagoniſta, *opus fuit malleo & cuneo ad avellendum tumorem a coſtis*: quid inde contrà nos concluditur? nonne notum & notiſſimum tales ubique repe-

„runt eodem nomine, ut tamen diſtinguerent, dixerunt Anevryſma ſpurium; In
 „verò enim Anevryſmate tunica arterie debilitatæ quamvis, manebant tamen cohe-
 „rentes, & ſanguinis impediabant exitum; in ſpurio autem ruptæ tunica liberum con-
 „cedebant.

[a] Clauſum Anevryſma (quod tantùm arteria dilatata audit.) Ruyſch. obſ. 37. & idem pag. 87. obſ. xciv. Nihil magis admiratione dignum crediderim, quam vaſu membranacea, quò magis DISTENDUNTUR, eo magis ſepè ab humore heterogeneo incrassari. In arteriis hoc evidenter demonſtravi obſ. 37. & 38. Ex quæ palam ſit, juxta Ruyſchium, Anevryſma clauſum eſſe diſtentionem, ſeu arteriæ dilatationem abſque ullâ parietum ruptione. Ea obſervatio xciv. Lectori perſuadet abſque ullo ſcrupulo, quantæ ſagacitatis & indiſtriæ fuerit *Ruyſchius* in tunicis aortæ examinandis, dum Anevryſmata perſcrutabatur de quibus diximus obſ. 37. & obſ. 38. unde ulteriùs confirmatur hæc fuiſſe vera, & ab expansione tantùm aortæ facta.

f * j Ille vocat clauſum Anevryſma quandò, ruptis interioribus arteriæ tunicis, ſanguis recluditur intrâ membranam externam; talia autem admittit Anevryſmata, at eſſe vera pernegat, tale ſibi quæſivit ſubterfugium, ut obſervationibus meis reſponderet, at incaliſſum fecit, ſi arteriæ membranam internam ſubſiſtere demonſtraverim.

f b j Theſ. ix. pag. 11. n. v., Notatur CAPSULA in quâ conſervatur Anevryſma cujuſdam arteriæ intercoſtalis ex homine, magnitudine ovi Gallinacii.

„Not. 1. admiratione dignum eſt, arteriam tam exilem in tantam molem ſe
 „ſe potuiſſe extendere, id quod mihi ter quaterve videre contigit. Juvenis erat cuius
 „affectum hic recito, qui à longo tempore de præcordiorum anxietate quæſtus
 „fuerat, & tandem ſummis angoribus & lypothimiis correptus, tuſſi moleſtâ,
 „ſubito fatiſ ceſſit.

„2. Haud minùs mirabar, imò obſtupeſcebam Anevryſma tam firmiter coſtis
 „& adjacentibus vertebrarum corporibus fuiſſe adnatum, ut non ſine malleo &
 „cuneo, ab illis ſeparare potuerim „Ruyſchius,

riri adhaesiones viscerum, vasorum, membranarum, quin idè subsequatur ruptio, monstrosa licet fuerit extensio; sæpe vidit ea Ruyschius, præprijis obser. XCII. *enormis intestini coli dilatatio* & Obs. XCIV. *prodigiosa ureteris dilatatio*. & Obs. XCV. (a) Probat apertè talis administratio illud anevryisma evulsum integrè & absque ullà laceratione servatum fuisse. Quis inter anatomiae profectores, rationem istius processûs ignorat? Dum ipsa partim ossa discindimus cuneo & malleo, ut vasa habeamus integra, ne minimè lacerata: Idè procedebat Ruyschius (discindendo ipsa ossa) nè per avulsionem fieret anevrysmatis dilaceratio, & ut postea scrupulosius animadverteret aliqualis esset ruptio in hac arteriâ, nec ne, quia obtuscescebat tam exilem arteriam potuisse in tantam molem se se extendere absque ullà ruptione parietum; Si post avulsionem anevrysmatis, aliqualem, vel tantillam in arteriâ ruptionem vidisset Ruyschius, sanè dixisset; neque dignum admiratione affirmasset & typis mandasset rursus reponit antagonista, *non satis capi, quomodo, si tumor ille plenus fuisset sanguine fluido, tamdiu posset servari in capsulâ immunis à putredine* quare tam torquetur animo de re falsò suppositâ? Non erat sanguis in eo anevrysmate quod Ruyschius conservabat in capsulâ seu in *pyxide*, erat arteria simpliciter dilatata, & juxtà methodum Ruyschianam præparata; bonâ fide ibi dicebat per optimus competitor ex ipsâ plevrâ confici hanc capsulam, ut videbimus paragr. XII.

Cui stupendæ hallucinationi refutandæ in scripto suo ita respondet; **RISUM TENEATIS AMICI.** An adhuc jocaretur egregius antagonista, si patres academici publicum de hujus rei veritate darent judicium? Statim certè pateret hunc-ce errorem non semel, sed bis ab ipso in duabus nempè prælectionibus fuisse commissum. Hæ quanti sint meæ animadversiones penes est judices integerrimos dijudicare, *ad quos magnâ cum fiduciâ adversarium provocare nullus dubito.*

Mihi tantum superest, ut variis quæ in scripto suo exsuscitavit validissimus athleta respondeam; quæ sanè reticuissem, ut pote cum vix ullius sint momenti; at ne quid responso deesse videretur, hæc omnia in modum diarri solvam. Itaque sit.

BREVIS HISTORIA DISPUTATIONIS.

X. Pathologiam expositurus, morbos recensebam simplices methodo analiticâ, eos dein syntheticâ componebam veluti occurrunt clinicis; hæc ut felicius præstarem, morbos acutos & chronicos ad quædam, ad tot quasi classes cardinales reducebam capita. (*) Subsequentî die Cathedram conscendit

[a] Sic idem Ruysch. advers. anat. dec. I. n. IV. *clarum mihi quidem videtur, extremitates arteriarum obstructas abire in tumores præternaturales, mutatâ penitus nativâ formâ. Nonnè anevryisma, varix, phliethena, atque alii similes morbi, exempla clara exhibent? Id enim anatomici est, de non exploratis silere potius, quam luxuriosè excogitare.* Ita & n. 2. pag. 7. & 8. demonstrat vasa sanguifera expandi in molem vix imaginabilem. Sic LAU. HEISTERUS comp. anat. tom. II. pag. 10. *experientiâ convictus affirmo, aque facillè, aut fortè adhuc facilius, vascula minima in vesiculas mutari posse.*

(*) Sic fuerunt institutæ classes Morborum Chronicorum.

Prima classis. Morbi ab inspillatione fluidorum prædominante.... qui morbi sunt debellandi præsertim aperientium ope.

Antagonista, primam habiturus prælectionem, in eâ (nescio quâ ratione inductus) meam ad praxim additionem damnavit, nihil tamen, quod mirum videbitur, proponens meam adversus methodum, & licet sin dekursu pluriès me lacerasset diæteriis, ne verbum quidem protulit contra ullam ex meis prælectionibus; interim ipse proposuit methodum (*) cujus ego (contemptis autem diæteriis) factâ recensione, monui eam praxi ac sanæ Theoriæ penitus esse adversam; ille verò (summo quidem adstantium stupore) reposuit hæc varia se ab Auctoribus fuisse mutuatum, iisque nullatenus adhærere, ultrò igitur cedens, & ea quæ ad praxim summopere utilia, imò & necessaria nuperrimè habuerat, subito deferens, ad alia transiit novam multòque accuratiorem, uti gloriabatur, Anevrysmatis Theoriam exhibiturus; Contendit itaque nulla dari Anevrysmata verà, at rumpi tunicas in omni Anevrysmo. (a)

XI. Fateri ultrò non dubitaverat antagonista se omnia prælectionis præteritæ argumenta è scriptoribus variis excerptis; ergo aiebam, hæc eadem mox confitebitur, Cum omnia de anevrysmate à verbo ad verbum exprom-

Secunda classis. Morbi à sero malè permixto & exuperanti, cum laxitate vasorum... debellandi per évacuantia & aperientia, sociando in fine roborantia.

Tertia classis. Morbi à siccitate fluidorum, cum aliquali acrimoniâ, & cum tensione nimia solidorum, ac per intervalla cum tensione veluti spasmodicâ... debellandi per diluentia, levia sociando aperientia, atque adhibendo antispasmodica, paroxysmi tempore præsertim.

Quarta classis. Morbi ab acrimoniâ fluidorum prædominante cum aliquali inspissatione... debellandi per edulcorantia præcipue, aperientia sociando levia.

Quinta classis. Morbi ex iis quatuor classibus variè combinatis exurgentes... debellandi per eas quatuor formulas variè combinatas juxta leges prudentiæ.

Quare hæc præcisè sic instituerim classes, monui in prima prælectione, & ratio patebit ex eo quod methodus curandi ab ipsa classis denominatione peti debeat. Hæc satis intelliguntur à clinicis, è quorum, *istius præsertim Academia celeberrime* scriptis, istas eduxi classes. Quinque alias ad morbos acutos, & tres ad affectus à viru peculiari pendentes, statui, ut collegerunt benemulti qui meis privatis adfuerunt prælectionibus, pluribus ab hinc annis.

f*J Quà morbos omnes in activos & in passivos distinxit, Febres, morbos inflammatorios reponens in priorum classe, affectiones autem hystericas, melancholicas, hypochondriacas, & obstructions *cujuslibet generis* indiscriminatim recensens in secundâ.

faj *Varias legi*, inquebat, & pervolvi numero plures Anevrysmatum observationes, has præter quæ referuntur à Doctore fremdio, vix due aut tres examinate per dissectionem reperiuntur, quæ characterem habuerint Anevrysmi veri, &c. Sic autem Monro. J'ai lu un grand nombre d'Observations d'Anevrysmes, outre celles qui sont rapportées par le Docteur Fremdio, & je n'ai pu en rencontrer plus de deux ou trois, qui aient été examinées par la dissection, & qui eussent le caractère d'Anevrysmes vrais &c. Essais de Méd. de la Société d'Edinbourg, tom. 2. p. 348.

Hallestii retulit experimentum (Hæmast. pag. 136.) ad vim probandam arteriæ, quâ suæ expansioni resistunt, undè conclusit sanguinis impetum numquam satis esse Anevrysmis veris, etiam exiguis efformandis, porro requiri cruoris acrimoniam quæ rodât parietes internos arteriæ (monuit tamen esse varices quandoque monstratas à solâ venarum simplici dilatatione) ultimò affirmavit Medicos adhucdum non satis capere quid foret Anevrysmata.

perit *clar. monro.* (†) Ista ne gravis accusatio videretur commentitia, librum iudicibus integerrimis publicè commisi: res palam erat; sibi ergo ipsi diffidens antagonista, nec amplius feliciter audens, fatetur se compilasse; *excerpsi equidem, concedo, à verbo ad verbum nego;* (verè à verbo ad verbum excerpterat, uti notum est omnibus;) ea dein in me protulit quæ nolo repetere, (a) non is sum qui dièteriis alios ledere velim, ei que lubenter ignosco (b) at in decursu, (exigebat pensæ ratio) dicens de anevrysmate, vera & spuria admisi contra *Freindium*; meæ opinioni firmandæ causâ, *Ruyfchium*, *Littrium*, *Acta reg. Acad. Heisterum & Morgagnum* citavi; & sanè in iis adeo parùm videbar ejus opinionem de industriâ impugnare voluisse, ut licet eadem die Cathedram conscenderit, nihil tamen opposuit, nec veritatem quam stabilire enixus fueram, impugnare fuit aggressus; verùm elapso circiter mense, ecce me ex improvîso arguit Antagonista; minimè probari ait ex scriptoribus præcitatis verà adesse Anevrysmata, imò hos inter *Ruyfchium* Seligens, eum ipsi favere in observatione XXXVIII. asseruit.

XII. At statim ipso telo refutavi Antagonistam, ipsam instituendo lectionem observationis *Ruyfchii*; alia legi loca, observationem præprimis ex thesauro nono, quibus pateret evidenter, vera Anevrysmata *Ruyfchium* admisisse; duas insuper *Littrii* observationes retuli, quibus (elapso jam prælectionis tempore) supersedere necessarium fuit . . . vim lectionis sensit adversarius, at malum corrigere minimè fas erat, ideòque, ut illius momentum eludere videretur, mirum certè sibi quæsitv effugium exclamando. *Adest error Typographi in observatione trigesimâ-octavâ, vel non sibi constat Ruyfchius... Quoad observationem thesauri noni, quis revelavit adversario tunicas arteriæ non ibi fuisse ruptas? Nonnè ruptionem eam suadet Ruyfchius quando dicit. NOTATUR CAPSULA IN QUA CONSERVATUR ANEVRYSMATA MAGNITUDINIS OVI GALLINACEI. Anevrysmata illud (prosequebatur Antagonista) sanguis erat contentus & conclusus intra CAPSULAM, QUÆ QUIDEM CAPSULA CONFICIEBATUR EX IPSA PLEVRA, & patet cum opus fuerit malleo & cuneo ad avellendum Anevrysmata à costis.*

XIII. Mirabar certè & obstupefcebam! confundebat Antagonista *capsulam* seu *pixidem* in quâ conservabat *Ruyfchius* sua præparata! hanc ex plevrâ confici *capsulam* affirmabat bonâ fide! ità posse sibi hallucinari Antagonistam dubitans ego, rursus citavi observationem, ut iterum de eâ ageret ille; plures autem admonueram qui animadverterent, an rursus similis committeretur hallucinatio; nec me spes elusit. Summo quippè adstantium stupore, eandem

† Exceptâ solummodò conclusione, quâ contendebat nulla omninò sensibilia dari vera Anevrysmata, quod numquam dixit *monro.*

(a) Facilis & simplex erat via pro tam gravi accusatione refutandâ & jam indicaram Adversario, vel publicum expostulare iudicium, vel saltem publicè ipsius libri lectionem instituire; quid enim ad rem tot dièteria? Nequaquam ea disputandi ratio decet eruditum.

(b) Imò circâ novas Auctorum ab ipso transcriptiones silui, licet enim paulò post integram prælectionem ab *Hallero* desumpserit, [agebat de monstris & de herniis] nihil publicè dixi, nec nisi adstantium paucis *Hallerum* exhibui.

circa *capsulam* pari errore deceptus est iterum... Ruyschium exhibui tunc iudicibus, publicam loci hujus peregi lectionem, ut omnes stupendam adverterent hallucinationem, simulque palam fieret utrum error adesset, nec-ne in observatione Ruyschii 38. Hinc rumore publico motus Antagonista, proficitur se Typis mandaturum responsa; quibus præ tenuitate mea respondi, leges litterariæ disputationis scrupulosè servando, nè minimum in Antagonistam proferendo dictetum, imò verba vitavi ancipitia, licet perpetuò provocatus... mihi satis erit si persuasus de iis fuerit lector, nihilominus adversarius, ad summas sæpè reductus fuit angustias; coactus fuit in secundâ abdicare quæ in primâ prælectione tantoperè jactitabat, in tertiâ fateri se compilasse, in aliis confugere ad errores Typographi, quos merè fingeat, nunc pariter contradictiones in ipsis Auctoribus supponere, & ejusmodi sibi querere subterfugia, ut inde se se expediret, at in iis me semper juxta statutam disputationis normam dirigere sum gloriatus.

VERORUM ANEVRYSMATUM OBSERVATIONES.

XIV. ANDREAS VESALIUS (circa medium seculi decimi quinti) *vocatus in consultationem pro nobili viro... statim ab exploratione dixit ESSE ANEVRYSMA EX DILATATIONE ARTERIÆ AORTÆ*, eo modo quo fit in venis quas varices occupaverint; idem asseruit se ejusmodi affectus vidisse in gutture, in pectore, in poplite, in brachiis, nec curari posse, nisi abscissâ parte affectâ, in ejusmodi anevrysmate se quandoque reperiisse humorem concretum instar glaciei, aut humoris cristalini, interdum veluti sanguinem concretum, aut molam, in vivis corporibus verum sanguinem deprehendisse, in defunctis nigrum & syderatum, & cum gravissimis doloribus ægros mori, spontè interdum fieri EJUSMODI VASORUM DILATATIONEM, interdum ex causâ antecedente, [qualis fuit in hoc nostro ægro] dissecto corpore reperimus id quod vesalius prædixerat; in ipsâ arteriæ aortæ cavitate tumorem prægrandem, durum, carnosum ex sanguine arteriali concretum, qui foras etiam protuberans, in dorso dolorem & pulsationes inferebat, ejusmodi nimirum quales in arteriarum pulsu deprehendi solent. Ita referente adolpho occone. Sequentia scripsit Vesalio, ACHILLES GASSERUS. *Tota autem anevrysmaticæ compages cum suis contentis PUGNUM non parvi hominis, sed ovi struthiocameli magnitudinem ferè æquabat. Videat. Observat. 81. Joann. Udalr. rumleri.*

Reperiri ejusmodi arteriarum distensiones [dum hoc vesalii anevrysmata narrat] fatetur ipse FREINDIUS, *arterias quidem, inquit, distendi posse, ex frequenti hominum veneno & aliis quibusdam affectibus mortuorum inspectione notum est; notabilis illa est historia A VIDO VIDIO relata, quam & ipse raram fatetur, de enormi omnium circumquaque capitis arteriarum intumescentiâ, quæ ingentes repræsentaret varices hist. Med. pag. 51.*

PAREUS Chapitre XXXIII. pag. 285. *Les Anevrysmes qui viennent aux parties intérieures, sont incurables... Ce que j'ai vu au corps mort d'un nommé Balanger maître tailleur d'habits, lequel avoit un anevrysmes à l'artere venaëse, dont il mourut promptement en jouant à la paulme, parceque ledit vaisseau se creva. je l'anatomisai & trouvai une grande quantité de sang épanché dedans le Thorax, & le corps de l'artere dilaté jusqu'à y mettre le*

poing, & sa tunique interne toute offeufe, ce que je monftrai peu après aux Ecoles de Médecine à plusieurs auditeurs, faifant une diffection anatomique, dont les fpectateurs furent grandement émerveillés, & pour ce, la garde en mon Cabinet comme chofe monftréufe.

Lazarus Riverius Prof. Monfp. apud Theop. bonetum lib. II. pag. 496. Nos fimilem cafum ante duos annos in hac urbe vidimus, nempe anevryfma in pectore, ex arteriæ dilatatione, quæ pueri 15. annorum pugnum recipere poterat: tunica verò arteriæ cartilagineam craffitiem ac duritiem acquifierat.

Item. Riverius Obferv. XXXIV. in D. Pelet cive Monfpeliensî inventa eft arteria magna afcendens a corde ad claviculam ita dilatata, ut BRACHII FERÈ MAGNITUDINEM æquaret, & ovum gallinaceum in cavitatem fuam facile admittere poffet. Præterea tunica illius admodum denfa & cartilaginea evaferat, quod admirabilem naturæ providentiam notat, quæ TUNICÆ MAXIMÈ DILATATÆ RUPTIONEM EVITARE CONTENDENS; eam denfiozem ac duriozem effecerat.*

Clar. Ferren quæft. nonâ. difp. Anevryfmatis parietes rigidiores, & in locis nonnullis cartilaginei, ut poff riverium, obfervavimus, quandoque evadunt... anevryfma verum eft facciformis arteriæ ampliatio... Quod ANEVRYSMA eft in arteriis, idem VARIX in venis, neque aliundè difpar generationis & caufarum modus.

„ Vaterus Mifcel. Curiof. Dec. III. an. 9. 10. anevryfma aortæ mirabile...
 „ tandem vero aorta paulò fub corde ad ufque diaphragma, ultra duorum pug-
 „ norum, vel capitis fere magnitudinem extenfa, & tota fanguine grumofa in
 „ polypos ferè fibrofos lamellatim concreto videbatur: ubi inluper hoc notabile
 „ erat, quod tunica arteriæ interior aliàs tendinofa, hîc potiùs cartilaginofa,
 „ quafi offea, fed ubivis difrupta, tunicæ exteriori mufculofæ fruftulatim con-
 „ necteretur. Quo fpectaculo vifo, mirari fatis non potui, quomodd' ex fractu-
 „ ra coftarum, & preffurâ vellæfione arteriarum tam gravi, & tantâ trunci
 „ arteriæ laceratione æger tamdiu & ultra triennium fupereffe potuerit, (a)

XV. Ulteriùs adhuc demonftratur fieri Anevryfmata, in quibus tunicæ interiores integræ fubfiftunt; ex obfer. CL. LITTEU, quæ minutiffimæ funt, ipfo referente Freindio; fi legantur abfque ullo præjudicio, litem noftram judicant, fruftula folum excerpti; poffunt integræ obfervationes legi apud D. JAMES, Dict. univerf. de Med. Mr. LITTE, année 1707. Mémoires, pag. 17. J'obfervai que le tronc de l'Aorte depuis neuf lignes au-deffus du cœur, jufqu'à l'endroit où il prend le nom d'Aorte defcendante, avoit fes tuniques beaucoup plus minces, & étoit fort dilaté, de forte que prefque toute la dilatation s'étoit faite en-devant & en haut... Il y avoit au-dedans de cette

[*] J Palam eft tunicam arteriæ internam fuiiffe integram, cum de eâ præcifè fiat mentio apud Pareum, & Riverium. Juxta divifionem antiquorum confatabat (ut) Villifius demonftravit; j carneâ tunicâ, glandulofâ, & aliâ tertiâ magis interiori.

[a] Ea obfervatio videbitur primo influitu nobis adverfa, quia difrupta, & lacerata erat Aorta in tantâ trunci portione; fed ibi præcifè notatur ruptionem fuiiffe in internâ tunicâ feu Villifianâ, & confervatam fuiiffe tunicam carneam feu mufculofam, cui anneâbatur interior; erat ergò verum Anevryfma, in quo demonf-

poche environ deux pintes de sang enfin , la surface intérieure de la poche du tronc de l'Aorte étoit lisse & polie en certains endroits , & inégale en d'autres. L'égalité de cette surface étoit naturelle , & elle dependoit de la tunique intérieure de la poche qui s'étoit conservée entière. Et pag. 22. Les parois de la poche de l'Aorte étoient très-minces en certains endroits , & fort épaisses en d'autres. Les endroits qui étoient minces , l'étoient pour deux raisons. 10. Parcequ'il n'y avoit que les simples tuniques de l'Artere.

20. A cause de l'extrême dilatation , que ces tuniques avoient souffert par l'impulsion du sang , & par son amas dans la cavité de la poche. Les parois de la poche étoient épaisses aux endroits où les fibres polypeuses s'étoient attachées à la surface intérieure , & l'épaisseur y étoit plus ou moins grande , suivant qu'il y avoit plus ou moins de ces fibres posées les unes sur les autres , elles formoient plusieurs plans qu'on separoit facilement les uns des autres.

Année 1712. Mémoires, pag. 78. sur un Anevrysmes vrai par Mr. LITTE.

Un Homme âgé de 44. ans étant mort d'un Anevrysmes , je fis l'ouverture de son Cadavre pour bien examiner les particularités de cette Maladie. Cet Anevrysmes étoit un Anevrysmes vrai , c'est-à-dire , une dilatation extraordinaire d'Artere il avoit quatre pouces de longueur sur deux & demi de largeur à l'endroit de son plus grand diamètre. . . . Il étoit continu par toute sa base à la partie supérieure droite du tronc de la grosse artere , dont-il n'étoit qu'une extension & un allongement. Après avoir examiné cet Anevrysmes dans la situation , je le separai de toutes les attaches & en fis l'ouverture.

J'observai ce qui suit à pag. 79. ad 81. & pag. 83. Les membranes du tronc de l'Aorte , quoiqu'elles eussent dû être fort minces , à cause de la grande dilatation qu'elles avoient souffert , avoient cependant conservé leur épaisseur naturelle. †

Clar. Duvernoy in comment. Acad. Petropolit. tom. VI. refert observationem anevrysmi veri aortæ , scrupulosissimè examinati , & ut uti loquar , melancholicè. reperiit tunicam internam , dissecuit a tunicâ carneâ , leg. ejus differt. a pag. 308. ad paginam 320. debet pluries perlegi , ut pote primâ vice vix concipiatur. Societas edimburgensis in ultimo tomo illud sic indicat anevrysmâ. Mr. Duvernoy d'écrit un sac anevrysmal qui occupoit depuis la troisième jusqu'à la sixième des vertebres du dos. Ce sac n'étoit autre chose que l'Aorte dilatée , & qui avoit six pouces & demi de largeur , sur autant de longueur. Ess. & Obser. de Med. de la société d'Edinbourg Tom. VII. pag. 109. Petrus de Marchetis Obser. 48. patuit membrana interna arteria

trabatur tunica musculosa ; quod sufficit , juxta Antagonistam , licet fuerit rupta & dilacerata interior tunica , insuper prius fuit dilatatior Aortæ , quam hæc dilaceratio tunicæ , & ut optimè notat D. Duvernoy , ex administratione Anatomicâ fiunt forsitan eæ dilacerationes , præsertim in ossis tunicis.

†† Ex omnes observationes debent exactè perlegi , nè corrosio tunicarum quæ ibi quandoque memoratur , nobis adversari videretur , notari etiam velim vera anevrysmata sæpè rumpi paulò ante mortem , aut per dissectionem ; nihilominus abentur a medicis ut vera , si sit exterius corrosio , quod ita sæpè fit,

magna, priusquidem laxata, post modum verò, cum dilatationi nullus esset locus disrupta; anevrysmata itaque fuit in arteria magna extra cor duos solummodo digitos transversos.

Lancisus in tract. de anevrysmate prop. XIX. XXIX. & XXX. & Observ. quintâ de repentinis morbis. pag. 158. minutissimè de iis loquitur.... Anevrysmatis intereà cavitas tam ampla occurrit, ut pugnum facillè admisset, tamque grumoso sanguine plena, ut nihil fluidi amplius capere possederetur; NUSQUAM TAMEN MAGNO ALIQUO FORAMINE DEHISCEBAT, licet ad cordis basim intra pericardium, & ad inferum latus anevrysmatis nigra quædam stria, majorum fortè futurorum biatium indicia observata fuerint... Valsalva Dissert. anat. 1â. pag. 130 131. sepe anevrysmata circa præcordia contingunt, ut propriâ observatione edoctus sum. (†)

Jacobus Douglassius. Dissert. de peritonæo pag. 56. Sequitur anevrysmata duplicis saltem esse generis, quorum alterum spurium, alterum verum audit. Anevrysmata spurium est quod a causâ externâ ex. g. vulneribus aut puncturis in missione sanguinis oritur ANEVRYSMATA VERA, sive ea quæ a causâ internâ oriuntur sæpius semper a dilatatione totius substantia arterie initium capiunt; & præterea tumores ejusdem generis sæpius in arcu aortæ, quam in omnibus aliis corporis partibus simul sumptis occurrere consueverunt.

Joan. Bapt. Bianchus Hist. hepat. pag. 138. anevrysmata ex simplici extensione, per frequentes cadaverum exenterationes interdum observavimus in hepate, ut nuper dextra celiacæ propagines normiter dilatatas demonstrabamus... alterius generis anevrysmata, seu junctam rupturam in arteriarum tunicis cum notabili dilatatione, non percipimus huc usque in jecinoribus defunctorum.

XVI. Innumera sparsim apud auctores reperiuntur observationes magnarum

†† Adest ibi naturaliter sinus a Valsalva detectus, quem maximum, vel quartum aortæ sinum vocat. leg. morgagni Epist. anat. XV. in septem prioribus paginis & pag. 86... pluries hunc sinum demonstravi, in quibusdam cavum aortæ ad augebat in arcu, quartâ parte, membranâ semper superstitè interiori, politâ, simpliciter expansâ, hic duo possem referre exempla anevrysmatis in quibus nulla erat ruptio & corrosio; licet duplò major aorta fuerit.

Morgagnus Advers. Anat. 11. animadv. XLI. „ Cum trahi in dubium nequeat... aortæ arcum non longè a corde incurrenti sanguini objectum, hujus cursum „ subito, & violenter inflectere, facillè intelligitur si cordis impulsus nimium intendatur, & præsertim si aorta vel a primordiis minùs firma sit, vel ab erosivo aliquo principio cujus indicia in aortæ jam expansæ, aut hic illic ossificatæ tunicis evidentiùs prodere se solent debilitata, facillè inquam intelligitur, primum in hoc, aut „ consimili rerum statu aortæ expansionem effici.... Ut pluries a me quoque ipso observatum., Et præced. animadv. & animadv. XLII. refert se vidisse dilatationes aortæ & advers. VI. animadv. XXIV. loquitur de veneta muliere quam cum amicis dissecuit, in quâ arteriæ subclaviæ sinistra superiores, possicque parietes in anevrysmata expanserant.

Ipse Freindius hist. Med. pag. 55. „ Certum est aortam supra ejus flexionem „ faciliùs dilatari posse, ob resistantiam eam quæ sanguini illic ex ejusdem curvaturâ opponitur; ex quo etiam in hac arteriæ parte ut plurimum anevrysmata „ producantur; ac si ista in dilatatione tantum consistant, nullibi hanc faciliùs quam in eo loco fieri posse credibile est.

†† Frider. Heisterus hujus dissert. interpret. „ anevrysmata vera etiam a causâ „ externâ exoriri posse, ut plerique recentiores docent, læsâ nimirum tantum „ ternâ parte arteriæ, interiori adhuc integrâ, experientia etiam nos hic loci docuit, ut alio tempore prolixius proponetur. Hinc anevrysmata verum tam a causâ „ externâ quam internâ, ut varii chirurgici scriptores recentiores, & cumprimis „ etiam parens in chirurgiâ suâ docuerunt.

dilatationum arteriarum. leg. tract. de tumoribus *Antonii Saporita* Prof. Monsp. pag. 167. ad 183. die 11. Febr. an. 1567. in nobili quodam britone, aorta tam amplius dilatata fuit ex aneurysmate, ut pugnum crassissimum exciperet mox à cordis egressu.... Itaque tam notum est quam notissimum non solum à dilatata, sed aperta & rupta arteria aneurysma fieri f†j

Andreas Laurentius Prof. Monsp. pag. 803. Legatus Florentia apud gallorum regem, subito incidit in apoplexiam... aperto cadavere cor tumebat & ad sanguinis libras tres vel quatuor apertum emittebat, arteria magna ore ita patente, ut brachii aequaret magnitudinem.

Alphonsus Borellus apud malpighium de polipo cordis dissert. reperta fuit aorta prope cor, quæ in tumorem concreverat ad mensuram duorum pugnorum.

Jacobus Thebart in ballon. conf. libr. conf. 107. in collegio Rhemensi cuidam sacerdoti aneurysma erat in cruribus. aperto cadavere reperta est magna dilatatio arterie, & sanguis in eâ arteriâ concreverat, indurueratque.

Andreas Cæsalpinus... repertum est romæ nuper... Cor valde amplum, & arteria quæ ducit ad pulmones duplò latior naturali.

Joel Langelotus in cadavere à M. Kirstenio anatomico & Medico insigni, aperto, omnia vasa ut & auriculae erant ampliata, mirè quæ dilatata, imprimis caudæ arterie aorta; præterea in vasis iliacis ejusmodi vitia sunt reperta.

Elmerus Observ. XVIII miscell. curios. an. 1. de. 1. aneurysmata excitari posse in ipsa quoque aortâ, docuit experientia, & tale aneurysma favore nob. Rivæ anat. famelissimi videre mihi contigit Romæ in suo museo.... cujus figuram ipsemet prælo commisit. B. aorta crassa & corde latior; M. aorta descendens naturali quadruplò grandior.

Observ. CXIX. D. Job de Muralto Ephemerid. ger. an. 3. secundæ decuriæ. Imò utramque arteriarum tunicam, [internam ex triplici substantiâ juxta, clar. villis constantem] imbibendo serosi humoris plures, quam naturaliter aliàs solent, particulas extendi, sicque aneurysma quasi aliquod produci posse, satis est credibile; non secus ac venarum nimiam extensionem aneurysmata improprie dicta, venarum sive varices constituere, notum est, præcipue EVIDENTER satis id docentibus amplissimis illis arteriæ magne aneurysmatibus, quales, præter alios, D. Riva exhibuit, & ab eodem mihi etiam an. 1670. Romæ demonstratum; nec dissimile postea patavii quoque in solenni anatomia, pugni magnitudine, & quinque circiter unciarum pondere an. 1671. conspexeram... quales etiam an. præcedente in nosocomio ad D. Franciscum se vidisse, projecto attestatus fuerat, quod mole suâ ipsius sterni suprema parti foveam aliquam imprefferat. leg. Boerhaav. patho. pag. 156. comment. Halleri.

Leg. Epistola de aortæ polypo D. Clar. Carolo Patino, repertiunda in appendice ad an. 1. Decur. III. Ephem. Germ. ... verum ad cor accedentes, arteriam magnam ita dilatatam offendimus, ut aliud cor in pericardio conclusum emularetur. leg. Act. Paris. an. 1710. 1721. 1722. 1723. 1732. 1733. 1736.

Leg. Vesperus, pag. 185. Exerc. de loco affect. in apoplec. Baptista Rusch. pifis; Prof. Anat. Obser. Chirurg. pag. 432. Fabric. Hildanus, centur. 3. Obser. 44. ... Paul Barbette praxis Medic. lib. 2. cap. 3.... Bourdelotius Diar. Gall. an. 1681. Laurentius Heisterus in Chirurgiâ suâ, & in Academiâ Juliâ. Abbregé des Transactions philosophiques, com. III. tom. VII. Philosoph. transf. n. 402. n. 265. sepulchr. Anat. Boneti. Biblioth. Chirurg. Mungeti. ex quibus palam fit observationes verorum Aneurysmatum, non ita esse raras, ut vix acne vix quidem reperiantur. Possent demonstrari ratione, analogismo, & experimentis, si locus hic esset.

f†j Vera & spuria admittebat *Saporita* contra *Fernelium*, qui omnia fieri ex simplici dilatatione afferebat.

A MONTPELLIER,

De l'Imprimerie d'AUGUSTIN F. ROCHARD, seul Imprimeur du Roy. 1749